

2010 Diciembre, 2(2): 1-1

## **LEIOMIOSARCOMA CUTÁNEO PRIMARIO: A PROPÓSITO DE UN CASO**

Tettamanti A, Harismendy C, Manfredi D, Castelleto R

*Lugar de Trabajo Cátedra de Dermatología, Facultad de Ciencias Médicas - UNLP*

e-mail: *ffcorrans@yahoo.com.ar*

### **Introducción**

El leiomioma es un tumor maligno mesenquimatoso infrecuente. Su incidencia es menor al 10% de los casos de los sarcomas de tejidos blandos. Afecta a ambos sexos y su presenta entre la quinta y sexta década de la vida, los pacientes inmunocomprometidos son más propensos a desarrollar este tumor.

Se lo clasifica en leiomioma cutáneo (derivado del músculo piloerector del pelo y ubicado histológicamente a nivel dérmico) y el leiomioma subcutáneo (derivado del músculo liso de las paredes vasculares). Su diagnóstico es clínico e histológico siendo esencial la inmunohistoquímica. Los diagnósticos diferenciales son diversos tumores cutáneos.

El tratamiento de elección de este tumor es con la cirugía donde debe tomarse un margen de seguridad de 3 cm o la cirugía micrográfica de Mohs. El fracaso terapéutico está dado por la recurrencia que es muy frecuente en este tumor.

### **Objetivo**

Demostrar al alumno de pregrado la variabilidad diagnóstica en tumores de tejidos blandos.

### **Materiales y métodos**

Presentación de un caso clínico de Leiomioma.

### **Resultados**

La consideración de la afección dentro de los diagnósticos diferenciales del carcinoma basocelular y el espinocelular.

### **Conclusiones**

Demostrar a través de un caso no frecuente de tumor de partes blandas que se debe estar atentos a los diferentes diagnósticos diferenciales ya que en este caso las metástasis y recurrencias son habituales en contrapartida con los tumores frecuentes de dermatología (basocelular y espinocelular) que no presentan el mismo comportamiento de agresividad.