

2017 Octubre, 7(1): 1-1

REGISTRO DE HISTEROSCOPIAS DURANTE EL PERÍODO 2016-2017, HALLAZGOS ANATOMOPATOLÓGICOS

Blanco, J.; Mazzucchelli, E; Forestieri, O

Cátedra de Ginecología B; Especialidad Ginecología, Hospital Italiano La Plata. oforestieri@gmail.com

Introducción

La Histeroscopia es un procedimiento que permite al ginecólogo observar el interior de vagina, cuello y cuerpo uterino. Este procedimiento puede realizarse con fines diagnósticos y terapéuticos. Se indica para el tratamiento de miomas uterinos de localización submucosa, pólipos endometriales, malformaciones uterinas, sinequias. Se indica también para el estudio y diagnóstico de sangrados uterinos anormales, hemorragia genital de la postmenopausia, engrosamiento endometrial. También, con el instrumental adecuado, sirve para retirar cuerpos extraños, como metaplasia ósea, Dispositivo intrauterino retenido. La Histeroscopia juega un rol importante en la medicina reproductiva. Siempre que una Histerosalpingografía muestre alguna alteración de la cavidad uterina es indispensable realizar una Histeroscopia.

Objetivos

Realizar un registro de Histeroscopias llevadas a cabo en el Htal. Italiano La Plata en el período 2016-2017, evaluando las patologías más frecuentes y su rango etario de prevalencia.

Materiales y métodos

Se realizó una revisión de 270 Histeroscopias llevadas a cabo entre enero 2016 y julio 2017 en el Hospital Italiano La Plata. Se hizo una revisión de protocolos quirúrgicos y resultados anatomopatológicos.

Resultados

Se realizaron en total 270 Histeroscopias dentro de las cuales el resultado más prevalente fueron los pólipos endometriales con una edad media de aparición a los 55 años. Sin embargo, el rango etario es muy amplio, llegándose a presentar entre pacientes de 26 a 68 años.

La Hiperplasia del endometrio puede presentarse histológicamente como simple o compleja, según las características de la glándulas; con o sin presencia de atipia, siendo la hiperplasia con atipia una lesión premaligna que tiene riesgo de progresión a carcinoma de endometrio.

Los Hallazgos correspondientes a Hiperplasia endometrial sin atipia fue del 17%, con una edad media de aparición de 45 años, mientras que la Hiperplasia con atipia se encontró en un 2,6% con una edad media de aparición a los 51 años.

Hubieron 3 casos de carcinoma de endometrio diagnosticados por Histeroscopia, que posteriormente requirieron estadificación quirúrgica. La edad media de aparición fue de 57 años.

Conclusiones

La patología benigna es el hallazgo más frecuente en las histeroscopias realizadas en 2016-2017, siendo los polipos endometriales el hallazgo mas frecuentemente encontrado. Afortunadamente, la patología premaligna y maligna de endometrio corresponde, en conjunto al 3,7% de los resultados.