

2023 Diciembre, 13(6): 1-1

## **ABDOMEN AGUDO SUBOCCLUSIVO: UNA MANIFESTACION INFRECUENTE DEL ABSCESSO PELVICO POST APENDICECTOMIA**

*Dra. Candia Guillermina, Jefe de Residentes HIGA San Roque, Gonnet*

*Dra. Hughes Victoria, Residente HIGA San Roque, Gonnet*

*Dra. Martiarena Rosario, Staff de División Coloproctología HIGA San Roque, Gonnet*

*Dra. Arro Carolina, Staff de División Cirugía Percutánea HIGA San Roque, Gonnet*

*Dr. Schlain Sergio, Coordinador de la División Coloproctología HIGA San Roque, Gonnet*

### **RESUMEN**

El absceso intraabdominal es una complicación postoperatoria frecuente de la apendicetomía por peritonitis. No es habitual que debido a la gran dimensión se manifieste como abdomen agudo suboclusivo. Estas colecciones dependiendo del tamaño y la localización pueden requerir de una reintervención quirúrgica.

Se presenta el caso de un paciente de 21 años que fue intervenido quirúrgicamente por una apendicitis aguda con peritonitis y evoluciona con la formación de un absceso pelviano de gran tamaño. Se muestran los métodos diagnósticos y la forma de resolución en un hospital público de la comunidad.